

Thông tin hữu ích

1 Bé em bé nếu quý vị cho bú bình. Không bao giờ kê bình sữa hoặc cho em bé ngâm bình sữa khi đi ngủ.

2 Hãy kiên nhẫn khi cho em bé ăn. Em bé cần thời gian và thực hành để tập ăn. Em bé ăn uống đồ tháo rất nhiều. Luôn luôn ngồi với em bé trong bữa ăn.

3 Bình dùng để đựng nước lã, sữa mẹ hoặc sữa formula. Chỉ cho em bé uống nước cốt trái cây bằng ly. Không bao giờ cho uống những loại nước ngọt như Kool-Aid®, nước ngọt có hỏi (pop), nước pha ngọt, hoặc nước đường. Cho em bé uống khoảng 4 ounces (120 milliliters) nước lã trong ly.



4 Không bao giờ ép em bé bú cho hết bình hoặc ăn cho hết. Em bé biết ăn bao nhiêu là đủ. Em bé sẽ cho quý vị biết em đã no bằng cách quay đầu đi nơi khác, ngậm miệng, nhè thức ăn ra khỏi miệng, hoặc ném thức ăn xuống sân.

7 Những loại thực phẩm có thể gây phản ứng vì dị ứng là:

- ▲ Sữa bò
 - ▲ Nước cam
 - ▲ Lòng trắng trứng
 - ▲ Các sản phẩm lúa mì
 - ▲ Các sản phẩm bắp
 - ▲ Cá và những loại hải sản khác
 - ▲ Các sản phẩm đậu nành như sữa đậu nành và đậu hũ
 - ▲ Đậu phộng (lạc) hoặc những loại hạt khác
 - ▲ Bơ đậu phộng
 - ▲ Sô cô la
 - ▲ Dâu tây
 - ▲ Cà chua sống
- Đa số em bé đều hết dị ứng khi lớn lên

Thông tin hữu ích

5 Xúc thức ăn ra đĩa trước khi cho em ăn, chứ đừng xúc từ trong lọ. Dùng thìa (muỗng) nhỏ để đút cho em bé. Dùng một thìa sạch để xúc thức ăn từ trong lọ ra đĩa. Nước miếng của em bé có thể làm hư thức ăn, và có thể gây tiêu chảy. Vắt đi bất cứ thức ăn hoặc uống nào còn thừa trong bình hoặc đĩa của em bé. Cắt lọ thức ăn còn thừa vào tủ lạnh. Hãy dùng hết trong vòng 2 ngày.



6 Mỗi lần cho ăn một loại thức ăn mới. Chờ năm ngày trước khi cho em ăn thử một loại thức ăn khác. Để ý xem em có bị phản ứng vì dị ứng hay không.

8 Một số phản ứng vì dị ứng là:

- ▲ Da nổi đỏ
- ▲ Đầy hơi
- ▲ Khó thở
- ▲ Tiêu chảy

9 Mua thức ăn thuần tuý. Tránh mua những loại thức ăn trộn nhiều món. Quý vị có thể tự kết hợp thịt, rau, và cơm hoặc mì. Những loại thức ăn này bổ dưỡng và rẻ hơn.



Cảnh giác: Em bé có thể dễ bị hóc nghẹn khi ăn hot dogs, các loại hạt, bắp rang, khoai tây chiên, nho, nho khô, rau sống, và bơ đậu phộng. Dừng cho em ăn những loại thực phẩm này. **Không** bao giờ cho em bé ăn mật ong hoặc những loại thực phẩm có mật ong. Em bé có thể bị bệnh nặng hoặc ngay cả bị thiệt mạng.

10 Cho ăn tráng miệng bằng trái cây. Em bé không cần ăn những loại tráng miệng dành cho em bé như bánh puddings, sữa trứng, và bánh ngọt.



11 Chùi răng em bé bằng khăn mềm thấm nước sau khi ăn.

12 Rửa tay quý vị và tay em bé bằng xà bông trước khi cho em ăn. Dùng nước nóng pha xà bông để rửa khay trên ghế em ngồi sau khi ăn.

Cho Em Bé Ăn Uống 6 đến 12 Tháng



Đây là mục tiêu của tôi cho con tôi: _____

Thức Ăn Cho Em Bé-Sáu đến Mười Hai Tháng

Hãy dùng bảng này để hướng dẫn cách cho em bé ăn uống.

Nếu con của quý vị sinh non, hãy hỏi chuyên viên dinh dưỡng của WIC.

Vào khoảng từ 6 đến 8 tháng

Khi em bé có thể:

- ✓ Cầm vững được vật dụng
- ✓ Tự ngồi một mình không cần người đỡ
- ✓ Bắt đầu nhai
- ✓ Dùng ly nếu có người giúp



Trước hết:


- ▲ Bắt đầu bằng những loại rau nấu chín lọc nhuyễn hoặc xay nhuyễn. Đừng trộn thêm muối hoặc đường.
- ▲ Bắt đầu tập cho em bé uống nước bằng ly nhỏ.

Sau đó

- ▲ Thủ cho em bé ăn trái cây mềm lọc hoặc xay nhuyễn. Đừng thêm đường.
- ▲ Bắt đầu cho uống nước cốt trái cây của. Giới hạn nước trái cây chỉ cho uống 2 ounces (60 milliliters) mỗi ngày. Pha 2 ounces nước trái cây với 2 ounces nước lă. Luôn luôn cho em bé uống nước trái cây bằng ly.

Ngoài ra:

- ▲ Cho ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- ▲ Để cho em bé bắt đầu tự đút lấy.
- ▲ Quý vị có thể dùng cái rây, máy xay, hoặc loại máy xay thức ăn em bé để làm thức ăn cho con.



Vào khoảng từ 8 đến 10 tháng

Khi em bé có thể:

- ✓ Cắn thức ăn
- ✓ Tự bốc ăn
- ✓ Dùng ly



Thêm:

- ▲ Cereal trộn nhiều loại cho em bé.
- ▲ Thịt hoặc gà lọc hoặc xay nhuyễn.
- ▲ Đậu nấu chín lọc hoặc xay nhuyễn.
- ▲ Cottage cheese (phô mai sệt.)
- ▲ Da ua trơn (không trộn trái cây).
- ▲ Lòng đỏ trứng nấu chín nghiền với sữa mẹ, sữa formula, hoặc da ua.

Ngoài ra:

- ▲ Đừng thêm muối, đường, mỡ hoặc gia vị vào thức ăn của em bé.
- ▲ Để em tự đút ăn.
- ▲ Tiếp tục cho em bé những loại rau trái mới để em thích nhiều loại thức ăn khác nhau.
- ▲ Khi em bé ăn nhiều thức ăn đặc hơn thì em sẽ bớt uống sữa mẹ hoặc sữa formula.



Vào khoảng từ 10 đến 12 tháng

Khi em bé có thể:

- ✓ Nhai và nuốt thức ăn mềm, nghiền và băm nhỏ
- ✓ Dùng ly
- ✓ Bắt đầu dùng muỗng



Thêm:

Từng miếng nhỏ thức ăn nấu chín hoặc mềm của cả gia đình:

- ▲ Cereals, bánh mì, và bánh lạt.
- ▲ Rau nấu mềm và trái cây lột vỏ cắt miếng.
- ▲ Phô mai nhẹ mùi cắt miếng nhỏ.
- ▲ Trái cây và rau nấu chín.
- ▲ Thịt mềm nấu chín, đậu hoặc đậu lăng nấu chín.
- ▲ Bánh mì nướng cắt miếng vuông, bánh lạt không muối, hoặc bánh tortilla mềm cắt nhỏ.
- ▲ Thịt bầm, gà hoặc cá nấu chín cắt nhỏ. Rút hết xương và những phần rắn.
- ▲ Đậu hũ miếng nhỏ.
- ▲ Thịt hầm.

Ngoài ra:

- ▲ Để em bé tự đút bằng muỗng hoặc bằng tay.
- ▲ Để em bé ngồi vào bàn chung với gia đình.
- ▲ Bắt đầu bớt dùng bình và dùng ly nhiều hơn. Khi ăn, cho em bé một ly nhỏ sữa mẹ, sữa formula, hoặc nước lă.
- ▲ Bỏ dần bình khi em bé được 12 tháng. Nếu quý vị để lâu hơn, em bé có thể không muốn bỏ bình. Cho bú bình có thể làm sâu răng.
- ▲ Em bé sẽ ăn nhiều thức ăn hơn và bớt uống sữa mẹ hoặc sữa formula.



Vào khoảng 1 tuổi

Khi em bé có thể:

- ✓ Nhai và nuốt thức ăn mềm trên bàn
- ✓ Dùng muỗng



Thêm:

- ▲ Sữa nguyên chất, mỗi lần uống một chút.
- ▲ Cả quả trứng nấu chín.

Ngoài ra:

- ▲ Cho em bé ăn 3 bữa nhỏ mỗi ngày kèm theo những bữa ăn vặt.
- ▲ Khi em bé quen uống sữa nguyên chất, hãy cho em bé uống 4 ounces (120 milliliters) trong ly, mỗi ngày 4 lần.
- ▲ Cho em bé uống sữa nguyên chất từ 1 tuổi đến 2 tuổi.
- ▲ Chỉ cho em bé uống bằng ly.
- ▲ Nếu quý vị cần được giúp để cho em bỏ bú bình, hãy hỏi nhân viên WIC.





Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) is pleased to provide camera-ready art for printing this educational material. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team

P R I N T I N G S P E C I F I C A T I O N S

Title: Feeding Your Baby: 6 to 12 Months

Size: 16.5 x 9

Paper stock: 60# text Sterling gloss white

Ink color: 4-color process

Special instructions: Prints 2 sides. Cover bleeds. Finished job folds to 5.5 x 9

DOH Pub #: 961-186